

**INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS**

FytoSave® é um estimulador dos mecanismos de defesa das plantas, com acção preventiva, devendo ser aplicado antes do aparecimento dos sintomas da doença.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Concentração Dose	Época e condições de aplicação	I.S.
Tomateiro, pimenteiro e beringela	Oídio (<i>Leveillula taurica</i>)	0,2 - 0,8 L/hl (máximo de 2 L/ha)	3 folhas já abertas no caule principal - maturação total: os frutos já atingiram a sua cor típica de plena maturação (BBCH 13-89).	-
Courgette, pepino, melão e melancia	Oídio (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	0,2 - 0,8 L/hl (máximo de 2 L/ha)	3 folhas já abertas no caule principal - o 3º fruto já atingiu o tamanho e a forma característica (BBCH 13-73).	-
Videira	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>) Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,2 - 0,8 L/hl (máximo de 2 L/ha)	1ª aplicação antes do aparecimento da doença, a partir de 3 folhas já abertas (BBCH 13).	3 dias

UTILIZAÇÕES MENORES [Art. 51, Regulamento (CE) nº 1107/2009]

"A eficácia e fitotoxicidade é da exclusiva responsabilidade do utilizador"

Cultura	Doença	Concentração Dose	Época e condições de aplicação	I.S.
Aboborinha (=courgette) e pepino (Ar livre)	Oídio (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	0,2 - 0,5 L/hl 2 L/ha	Tratar preventivamente, em condições favoráveis à doença, desde as 3 folhas verdadeiras até ao desenvolvimento do 3º fruto (BBCH 13-73). Evitar pulverizar sob luz solar direta. Máximo de 5 aplicações por cultura (intervalo mínimo: 7 dias).	1 dia
Pimenteiro e beringela (Ar livre)	Oídio (<i>Leveillula taurica</i> e <i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	0,2 - 0,5 L/hl 2 L/ha	Tratar preventivamente, em condições favoráveis à doença, desde as 3 folhas verdadeiras até à colheita (BBCH 13-89). Evitar pulverizar sob luz solar direta. Máximo de 5 aplicações por cultura (intervalo mínimo: 7 dias).	1 dia
Roseira (Ar livre / protegida)	Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,25 - 0,625 L/hl 2,5 L/ha	Toda a estação de crescimento, em condições favoráveis ao aparecimento da doença. Evitar pulverizar sob luz solar direta. Máximo de 8 aplicações por cultura (intervalo mínimo: 7 dias).	1 dia
Amora-silvestre, framboesa, mirtilo-azul (=arando-azul), morangueiro e mirtilo-vermelho (=arando-vermelho). (Ar livre / protegida)	Oídio (<i>Microsphaera vaccinii</i> e <i>Podosphaera macularis</i>)	0,25 - 0,625 L/hl 2,5 L/ha	Toda a estação de crescimento, em condições favoráveis ao aparecimento da doença. Evitar pulverizar sob luz solar direta. Máximo de 5 aplicações por cultura (intervalo mínimo: 7 dias).	1 dia

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

Courgette, beringela, melancia, melão, pimenteiro, pepino e tomateiro em estufa:

Realizar os tratamentos de modo preventivo, num programa de protecção contra o oídio. Iniciar as aplicações logo que as plantas apresentem 3 folhas e repetir com intervalos de 7 dias, sempre que a previsão das condições meteorológicas seja favorável ao desenvolvimento da doença. Aplicação: pulverização.

Videira:

Realizar os tratamentos de modo preventivo, num programa de protecção contra o oídio e o míldio. Iniciar as aplicações antes do aparecimento da doença, a partir de 3 folhas já abertas e repetir com intervalos de 8 dias, sempre que a previsão das condições meteorológicas seja favorável ao desenvolvimento da doença. Aplicação: pulverização.



Estimulador dos mecanismos de defesa das plantas

Solução concentrada (SL) com 12,5 g/L de COS-OGA



Autorização de Venda nº 1013 concedida pela DGAV

Data de produção / Data de validade / Número de lote: ver embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ESTE PRODUTO PODE SER USADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO



PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Tomateiro, pimenteiro, beringela, courgette, pepino, melão e melancia:

O número máximo de tratamentos a efetuar deverá ser de 5 posicionados até à maturação dos frutos. Os restantes tratamentos devem ser realizados com produtos fitofarmacêuticos de diferente modo de acção. Alternar o uso com fungicidas sempre que sejam visíveis sintomas de oídio nas plantas.

Videira:

O número máximo de tratamentos a efetuar deverá ser de 8 posicionados até ao final da maturação dos frutos. Os restantes tratamentos devem ser realizados com produtos fitofarmacêuticos de diferente modo de acção. Alternar o uso com fungicidas sempre que sejam visíveis sintomas de oídio nas plantas.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda:

- 250 - 1000 L/ha (Tomateiro, pimenteiro, beringela, courgette, pepino, melão e melancia)
- 400 - 1000 L/ha (Videira, roseira, amora-silvestre, framboesa, mirtilo-azul (=arando-azul), morangueiro e mirtilo-vermelho (=arando-vermelho) e pepino)
- 500 L/ha (Aboborinha (=courgette) e pepino)
- 500 - 1000 L/ha (Pimenteiro e beringela)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Evitar respirar a nuvem de pulverização.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminá-las pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada de 5 m em relação às águas de superfície, no caso de utilização na "verdeira".
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef.: 800 250 250.

Primeiros Socorros

Recomendação geral: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca, contacte o Centro de Informação Antivenenos ou um médico.

Em caso de inalação: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e em repouso numa posição que não dificulte a respiração; caso sinta indisposição, contacte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Em caso de contacto com a pele: Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada; enxaguar a pele com água abundante. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Autoproteção do socorrista: Não é necessário equipamento de protecção individual específico para os técnicos de primeiros socorros.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

*Marca registada.

Distribuidor em Portugal:
Fyfosani, Lda.
Quinta de São Brás
Serra do Louro
2950-354 Palmela
Tel: 212 333 019
info@biosani.com
www.biosani.com

Títular da autorização de venda:
FYTOFEND S.A.
Rue Georges Legrand 6
5032 Gembloux
Bélgica
Tel: 0032 (0) 81.728.840
www.fytofend.com

