



PreFeRal®

A solução que se dissemina pela sua estufa

O Bioinsecticida mais eficaz para o combate à mosca-branca e o mais compatível com os auxiliares.
(DGAV - AV 1231)

Bioinsecticida de contacto à base de esporos do fungo *Isaria fumosorosea* estirpe Apopka 97, obtida de forma natural, com o teor de 20% ou $2,10 \times 10^9$ u.f.c./g.

Homologado para o combate a moscas-brancas (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*) em culturas hortícolas e ornamentais em estufa.

Vantagens:

- Em condições óptimas o fungo dissemina-se pela estufa
- Eficaz contra moscas-brancas em todos os estados do ciclo de vida do insecto (ovo, larva, pupa e adulto)
- Inofensivo para os insectos auxiliares mais utilizados
- Inofensivo para o Ambiente
- Intervalo de segurança de 0 dias

RECOMENDADO EM:



AGRICULTURA BIOLÓGICA



Distribuidor em Portugal:

Biosani, Lda.

Quinta de São Brás | Serra do Louro | 2950-354 Palmela

Tel: + 351 212 333 019 | info@biosani.com

www.biosani.com

BIOSANI
Agricultura Biológica e Protecção Integrada, lda.



PreFeRal®

Disseminação natural do fungo

As condições óptimas de disseminação do fungo são humidade relativa superior a 80%, durante 8 a 10 horas, e temperaturas de 20 a 30 °C.

Nestas condições, o fungo ao penetrar e matar a mosca-branca irá formar micélio e esporular fora do insecto, estando disponível para infectar novos insectos. Assim, existe uma disseminação natural pela estufa, sem novas pulverizações.

O estabelecimento do fungo na estufa aumenta a eficácia da protecção contra as moscas-brancas.

Fora destas condições óptimas, o fungo irá causar a morte das moscas-brancas, não sendo observado o micélio no exterior dos insectos mortos.

CULTURA	PRAGA	CONCENTRAÇÃO	Nº MÁXIMO DE APLICAÇÕES	INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES
Tomateiro, pimentão doce, pimenta malagueta, beringela, pepino doce, pepino, pepino pequeno/conserva, curgete, abóbora, melão, meloa, melancia, feijão verde e ornamentais.	Moscas-brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> e <i>Bemisia tabaci</i>)	0,1% 100g/100L	3 por ciclo cultural	7 dias

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Hidratar o PreFeRal em água tépida (20 °C) durante 1 hora, antes da sua adição ao tanque do pulverizador
- São recomendáveis aplicações ao final do dia ou quando as condições de humidade relativa são mais elevadas
- Consultar a tabela de compatibilidades, em www.biosani.com, antes de misturar o PreFeRal com fungicidas
- Incompatível com produtos à base de cobre e enxofre
- Eficácia superior nos primeiros sinais da praga
- O pH da água deverá ser entre 4-7



Distribuidor em Portugal:

Biosani, Lda.

Quinta de São Brás | Serra do Louro | 2950-354 Palmela

Tel: 212 333 019 | info@biosani.com

www.biosani.com

BIOSANI
Agricultura Biológica e Protecção Integrada, lda.

Titular da autorização de venda
mitsui agriscience international S.A./N.A.
Avenue de Tervuren 270
1150 Bruxelles
Bélgica