

FICHA TÉCNICA

Duponchelia fovealis

CÓDIGO: **1L025** (1 mg)

1 - Nome do produto: Dispensador / difusor de feromona para *Duponchelia fovealis*.

2 - Tipo de formulação: Substância ativa impregnada numa manga tipo rolha de borracha natural vermelha.

3 - País de origem: Holanda.

4 - Prazo de validade:

- Congelador (< -18 Celsius): 6 meses;
- Frigorífico (< 6 Celsius): manter sempre no congelador;
- Temperatura ambiente (< 25 Celsius): manter sempre no congelador.

5 - Conteúdo:

- Feromonas *Duponchelia fovealis* 0,14 % p/p (1 mg/difusor, 1,43 g/kg);
- Filtros UV e antioxidantes 0,17 % p/p;
- Materiais inertes (borracha natural) 99,69 % p/p.

6 - ID das substâncias ativas:

- 1) Mistura de feromonas *Duponchelia fovealis*.

[Nenhuma informação detalhada é fornecida, pois nenhum dos componentes requer listagem de acordo com as disposições do Anexo II do Reg. (CE) 453/2010]

7 - Descrição física do dispensador da feromona: Manga tipo rolha de borracha natural vermelha. Dimensões: 9,1 mm de diâmetro exterior, 18,8 mm de altura total. Peso: 0,7 g.

8 - Descrição da embalagem: Saqueta laminada hermeticamente selada, ou em contentores.

9 - Condições de armazenagem: As feromonas devem ser armazenadas na embalagem original selada. Aconselha-se a armazenar o produto no congelador ou no frigorífico sempre que seja possível. Permita que os dispensadores atinjam a temperatura ambiente na embalagem original antes de abrir e utilizar.

10 - Montagem do dispensador da feromona: Não toque com o dispensador da feromona noutros objetos e use sempre luvas para manipular a feromona. A feromona deve evaporar livremente do dispensador. O dispensador deve ser colocado dentro da gaiola que acompanha a armadilha de funil ou colocada no centro da base de cola em posição

horizontal, no caso de armadilhas delta. Caso seja necessário perfurar o dispensador para auxiliar à sua instalação, a perfuração deve apenas ser efetuada na parte mais larga e o mais possível junto à margem do dispensador.

11 - Armadilha: Aconselha-se o uso da armadilha de funil (ver figura 11.1.1) ou delta (ver figura 11.1.2) para a captura deste inseto. Instalar as armadilhas na cultura, à altura onde se espera que o inseto atue. A armadilha de funil aconselhada é a com tampa verde, funil amarelo e copo transparente, no entanto, poderá utilizar outras combinações. Alertamos que o amarelo poderá atrair abelhas. Em alternativa, poderá ser utilizada a armadilha de água (ver figura 11.1.3) ou a cromotrópica montada em forma de rolo (4).




Figura 11.1 - Instruções de montagem do difusor na armadilha de funil (1), armadilha delta (2), armadilha de água (3) e cromotrópica enrolada (4).

12 - Período de vida da feromona: Após instalação na armadilha o poder atrativo da feromona para *Duponchelia fovealis* estará ativo pelo menos durante 45 dias. Para melhor desempenho, substitua a feromona após 1 mês.

13 - Informação acerca do inseto, por favor consulte:

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/20168>

<https://gd.eppo.int/taxon/DUPOFO>

Gestão documental Biosani:

Versão: B_FT_FE_42_2/12 de junho de 2025

Modificação: 02

Responsável: AF

Data de impressão: 12 / 06 / 2025