

# FICHA TÉCNICA

## *Exomala (=Anomala) orientalis*

CÓDIGO: **0L000** (1 mg)

**1 - Nome do produto:** Dispensador / difusor de feromona para *Exomala (=Anomala) orientalis*.

**2 - Tipo de formulação:** Substância ativa impregnada numa manga tipo rolha de borracha natural vermelha.

**3 - País de origem:** Holanda.

**4 - Prazo de validade:**

- Congelador ( < -18 Celsius): 2 anos;
- Frigorífico ( < 6 Celsius): 2 anos;
- Temperatura ambiente ( < 25 Celsius): 2 anos.

**5 - Conteúdo:**

- Feromonas para *Exomala (=Anomala) orientalis* 0,14 % p/p (1 mg/difusor, 1,42 g/kg);
- Filtros UV e antioxidantes 0,17 % p/p;
- Materiais inertes (borracha natural) 99,67 % p/p.

**6 - ID das substâncias ativas:**

- 1) (Z)-7-tetradecen-2-ona N° CAS: [146955-45-5];
- 2) (E)-7-tetradecen-2-ona CAS: [146955-46-61].

**7 - Descrição física do dispensador da feromona:** Manga tipo rolha de borracha natural vermelha. Dimensões: 9,1 mm de diâmetro exterior, 18,8 mm de altura total. Peso: 0,7 g.

**8 - Descrição da embalagem:** Saqueta laminada hermeticamente selada, ou em contentores.

**9 - Condições de armazenagem:** As feromonas devem ser armazenadas na embalagem original selada. Aconselha-se a armazenar o produto no congelador ou no frigorífico sempre que seja possível. Permita que os dispensadores atinjam a temperatura ambiente na embalagem original antes de abrir e utilizar.

**10 - Montagem do dispensador da feromona:** Não toque com o dispensador da feromona noutros objetos e use sempre luvas para manipular a feromona. A feromona deve evaporar livremente do dispensador. O dispensador deve ser colocado dentro da gaiola que acompanha a armadilha de funil ou colocada no centro da base de cola em posição

horizontal, no caso de armadilhas delta. Caso seja necessário perfurar o dispensador para auxiliar à sua instalação, a perfuração deve apenas ser efetuada na parte mais larga e o mais possível junto à margem do dispensador.

**11 - Armadilha:** Aconselha-se o uso da armadilha de funil com barreira cruzada (ver figura 11.1) para a captura deste inseto. Instalar as armadilhas na cultura ou área a monitorizar, à altura onde se espera que o inseto atue. A armadilha de funil com barreira cruzada aconselhada é a com tampa verde, funil verde, barreira cruzada (amarela ou verde) e copo transparente. Alertamos que o amarelo poderá atrair abelhas.



Figura 11.1 - Instruções de montagem do difusor na armadilha de funil com barreira cruzada.

**12 - Período de vida da feromona:** Após instalação na armadilha o poder atrativo da feromona para *Exomala (=Anomala) orientalis* estará ativo pelo menos durante 4 a 6 semanas. Para melhor desempenho, substitua o difusor após 5 semanas.

**13 - Informação acerca dos insetos, por favor consulte:**

<https://gd.eppo.int/taxon/ANMLOR>