

FICHA TÉCNICA

Rhagoletis pomonella

CÓDIGO: **1L257** (2 g)

1 - Nome do produto: Dispensador / difusor de feromona / atrativo para *Rhagoletis pomonella*.

2 - Tipo de formulação: Substância ativa contida em tubo plástico selado com tampão poroso.

3 - País de origem: Holanda.

4 - Prazo de validade:

- Congelador (< -18 Celsius): 2 anos;
- Frigorífico (< 6 Celsius): 1 ano;
- Temperatura ambiente (< 25 Celsius): 6 meses.

5 - Conteúdo:

- Atrativo para *Rhagoletis pomonella* 42 % p/p (2 g/difusor, 416 g/kg);
- Materiais inertes (plástico) 58 % p/p.

6 - ID das substâncias ativas:

- 1) Bicarbonato de amónio CAS: [1066-33-7].

7- Descrição física do dispensador da feromona: Tubo de plástico selado por um tampão especial de fibra porosa permeável (Fig. 7.1). Dimensões: 16 mm diâmetro exterior, 32 mm altura total. Peso: 4,8 g.



Figura 7.1 - Dispensador / difusor de atrativo constituído por tubo de plástico selado com tampão poroso permeável.

8 - Descrição da embalagem: Saqueta laminada hermeticamente selada, ou em contentores.

9 - Condições de armazenagem: As feromonas devem ser armazenadas na embalagem original selada. Aconselha-se a armazenar o produto no congelador ou no frigorífico sempre que seja possível. Permita que os dispensadores atinjam a temperatura ambiente na embalagem original antes de abrir e utilizar.

10 - Montagem do dispensador da feromona: Não toque com o dispensador da feromona noutros objetos e use sempre luvas para manipular a feromona. A feromona deve evaporar livremente do dispensador. O dispensador deve ser colocado dentro do cesto que se encontra no interior do copo mosqueiro ou colado diretamente na parte inferior da armadilha Rebell® Amarillo ou cromotrópica amarela. **Atenção:** Não remova e não obstrua o tampão poroso do dispensador.

11 - Armadilha: Aconselha-se o uso do copo mosqueiro (ver figura 11.1.1), da Rebell® Amarillo (ver figura 11.1.2) ou da cromotrópica amarela (ver figura 11.1.3) para a captura deste inseto. Instalar as armadilhas na cultura, à altura onde se espera que o inseto atue. Alertamos que o amarelo poderá atrair abelhas.



Figura 11.1 - Instruções de montagem do difusor no copo mosqueiro (1), Rebell Amarillo (2) e cromotrópica amarela (3). O difusor deve ser colocado no cesto existente no interior do copo mosqueiro, ou colado na parte de baixo das armadilhas Rebell® Amarillo e da cromotrópica amarela.

12 - Período de vida da feromona: Após instalação na armadilha o poder atrativo do difusor para *Rhagoletis pomonella* estará ativo pelo menos durante 45 dias. Para melhor desempenho, substitua o difusor todos os meses.

13 - Informação acerca do inseto, por favor consulte:

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/47060>

<https://gd.eppo.int/taxon/RHAGPO>

Gestão documental Biosani:

Versão: B_FT_FE_125_2/06 de junho de 2025

Modificação: 02

Responsável: AF

Data de impressão: 06 / 06 / 2025