

# FICHA TÉCNICA

## *Sitona lineatus*

CÓDIGO: **0L000** (5 mg)

**1 - Nome do produto:** Dispensador / difusor de feromona para *Sitona lineatus*.

**2 - Tipo de formulação:** Substância ativa impregnada numa manga tipo rolha de borracha natural vermelha.

**3 - País de origem:** Holanda.

**4 - Prazo de validade:**

- Congelador ( < -18 Celsius): 2 anos;
- Frigorífico ( < 6 Celsius): 2 anos;
- Temperatura ambiente ( < 25 Celsius): 1 ano.

**5 - Conteúdo:**

- Feromona *Sitona lineatus* 0,71 % p/p (5 mg/difusor, 7,1 g/kg);
- Filtros UV e antioxidantes 0,17 % p/p;
- Materiais inertes (borracha natural) 99,12 % p/p.

**6 - ID das substâncias ativas:**

- 1) 4-metil-3,5-heptanodiona N° CAS: [1187-04-8].

**7 - Descrição física do dispensador da feromona:** Manga tipo rolha de borracha natural vermelha. Dimensões: 9,1 mm de diâmetro exterior, 18,8 mm de altura total. Peso: 0,7 g.

**8 - Descrição da embalagem:** Saqueta laminada hermeticamente selada, ou em contentores.

**9 - Condições de armazenagem:** As feromonas devem ser armazenadas na embalagem original selada. Aconselha-se a armazenar o produto no congelador ou no frigorífico sempre que seja possível. Permita que os dispensadores atinjam a temperatura ambiente na embalagem original antes de abrir e utilizar.

**10 - Montagem do dispensador da feromona:** Não toque com o dispensador das feromonas noutros objetos e use sempre luvas para manipular a feromona. A feromona deve evaporar livremente do dispensador. O dispensador deve ser colocado dentro da gaiola que acompanha a armadilha de funil.

**11 - Armadilha:** Aconselha-se o uso da armadilha de funil (ver figura 11.1) para a captura destes insetos. Instalar a armadilha na cultura, enterrada parcialmente no solo como se ilustra na figura 11.1. A armadilha de funil aconselhada é a com tampa verde, funil verde e copo transparente.



Figura 11.1 - Instruções de montagem da armadilha de funil e do dispensador de feromona.

**12 - Período de vida da feromona:** Após instalação na armadilha o poder atrativo da feromona para *Sitona lineatus* estará ativo pelo menos durante 4 a 6 semanas. Para melhor desempenho, substitua o difusor após 5 semanas.

**13 - Informação acerca do inseto, por favor consulte:**

<https://gd.eppo.int/taxon/SITNLI>